CROP PLUS ZINC 10%®

Solagro

Proteinato con aminoácidos

COMPOSICIÓN:
Zinc (Zn) 10%
Nitrógeno orgánico 4%

MODO DE ACCIÓN: Es una solución concentrada de Zinc al 10%. El Zinc contenido en **CROP PLUS ZINC** previene y corrige las deficiencias del Zinc. Se encuentra formado un anillo estable ligado con enlaces covalentes con aminoácidos naturales, que son absorbidos con facilidad. Además, por tratarse de sustancias esenciales para la planta los aminoácidos ingresan directamente a las rutas metabólicas de las proteínas y de este modo el Zinc ingresa sin obstáculos a los tejidos vegetales.

USO RECOMENDADO: Es conocido que los suelos del Ecuador son deficientes en Zinc, lo cual, repercute gravemente en la producción de todo tipo de cultivo y en la salud de la población. Es indispensable aplicar **CROP PLUS ZINC** en los cultivos durante las etapas de crecimiento y cuajado de flores y frutos, puesto que estimula el crecimiento de ápices radiculares y caulinares y favorece el alargamiento del tubo polínico.
Favorece el crecimiento de la planta, el alargamiento de brotes, crecimiento de las hojas y las síntesis de varios sistemas enzimáticos. Es esencial para promover ciertas reacciones metabólicas y además es necesario para la producción de clorofila y carbohidratos. El Zn es poco móvil dentro de la planta, por lo tanto los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas nuevas y otras partes jóvenes de la planta.
El Zn es el micronutriente esencial en cultivos como Arroz, Maíz, Cítricos, Frutales, Cereales; puesto que limita el desarrollo y los rendimientos de estos cultivos.
CROP PLUS ZINC corrige síntomas de deficiencias de zinc, mejora el desarrollo radicular y estimula la formación y recuperación de los tejidos debido a que interviene en la formación de proteínas y auxinas que regulan el crecimiento de la planta e incrementan el rendimiento de las cosechas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar de forma foliar o por fertirriego, de acuerdo al requerimiento del cultivo y estado fenológico. Debe mezclarse con agua en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: CROP PLUS ZINC es compatible con la mayoría de plaguicidas, y fertilizantes agrícolas conocidos. No es compatible con productos de reacción fuertemente ácida o fuertemente alcalina. Se recomienda hacer pruebas previas de compatiblidad.

PRECAUCIONES: Utilice mascarilla, ropa protectora y guantes para la aplicación. Realice las aplicaciones de acuerdo a las dosis en la forma recomendada en la etiqueta.

PRESENTACIONES:
Envase x 500 cc.
Envase x litro.
Envase x galón.
Envase x 20 litros.

ELABORADO POR: BLOEMVELD.

DISTRIBUIDO POR: SOLAGRO S.A.

INDICACCIONES DE USO DE CROP PLUS ZINC 10%:

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
MAÍZ, ARROZ, CEREALES	Cuando aparezca el segundo nudo y repetir 10 días después.	Aplicación Foliar: 300 – 500 cc / 200 litros de agua Fertirriego: 1 – 2 litros / ha
BANANO	Desde el ahijamiento, desarrollo, floración y formación de dedos en los racimos. Cada mes.	
BRÓCOLI	15 días despés del trasplante y formación de la pella. Cada 15 días.	
FRUTALES	Desde la brotación, desarrollo y floración, de 3 a 5 aplicaciones con intervalos de 15 días, según requerimiento del cultivo.	
ORNAMENTALES	Durante la fase de crecimiento, formación del primordio floral y producción abierta.	
PAPA	Durante el desarrollo y prefloración, de 3 a 4 aplicaciones con intervalos de 20 días.	
TOMATE RIÑÓN, TOMATE DE ÁRBOL	Desde la prefloración, hasta la cosecha, 3 a 5 aplicaciones con intervalos de 15 días.	
CULTIVOS TROPICALES	Durante el crecimiento, prefloración y formación de frutos, para prevenir deficiencias.	